



---

## **ОСЛОЖНЕНИЯ СЛИВ-РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА**

Проф. Тешаев О. Р.,

PhD Рузиев У. С.,

Ниязова Н. Р.

Ташкентская Медицинская Академия  
Республика Узбекистан, город Ташкент

### **Актуальность темы:**

Лапароскопическая рукавная резекция желудка (SLEEVE) является одной из наиболее распространенных и эффективных бариатрических операций для лечения морбидного ожирения. Несмотря на ее доказанную эффективность в снижении веса и улучшении сопутствующих заболеваний, SLEEVE не лишена потенциальных осложнений, которые могут существенно влиять на результаты лечения и качество жизни пациентов. Понимание спектра, частоты, факторов риска и методов лечения осложнений после SLEEVE является крайне важным для оптимизации ведения пациентов на всех этапах лечения. Активное изучение данной проблемы позволяет разрабатывать стратегии профилактики, улучшать диагностику и совершенствовать подходы к лечению возникающих осложнений, что в конечном итоге способствует повышению безопасности и эффективности SLEEVE.

**Цель исследования:** Целью настоящего исследования является анализ спектра, частоты, факторов риска и методов лечения осложнений, возникающих после лапароскопической рукавной резекции желудка (SLEEVE).

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

1. Провести систематический обзор современной литературы, посвященной осложнениям после лапароскопической рукавной резекции желудка.



## International Conference on Educational Discoveries and Humanities

Hosted online from Moscow, Russia

Website: econfseries.com

16<sup>th</sup> May, 2025

2. Классифицировать осложнения SLEEVE по времени возникновения (ранние и поздние) и характеру (хирургические, метаболические, гастроинтестинальные, психологические и др.).
3. Определить частоту различных видов осложнений после SLEEVE на основании данных литературы и собственного клинического опыта.
4. Выявить основные факторы риска, ассоциированные с развитием специфических осложнений после SLEEVE.
5. Обобщить современные методы диагностики и лечения различных осложнений после SLEEVE.
6. Разработать практические рекомендации по профилактике и раннему выявлению осложнений после лапароскопической рукавной резекции желудка.

### Методы исследования:

Проведен ретроспективный и проспективный анализ данных пациентов, перенесших лапароскопическую рукавную резекцию желудка (SLEEVE). Анализировались демографические данные, предоперационные характеристики (ИМТ, сопутствующие заболевания), интраоперационные параметры, а также послеоперационные осложнения (время возникновения, вид, тяжесть, методы диагностики и лечения). Проведен систематический обзор литературы в базах данных PubMed, Scopus и Web of Science для обобщения мирового опыта по данной проблеме. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения SPSS.

### Результаты:

Ранние осложнения: Наиболее частыми ранними осложнениями были кровотечения из линии степлерного шва и несостоятельность линии степлерного шва. Реже встречались инфекционные осложнения и тромбоэмболические события. Поздние осложнения: Среди поздних осложнений преобладали гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), стриктуры желудочного рукава и недостаточная потеря веса или его повторный набор. Также отмечались случаи дефицита микронутриентов.



## International Conference on Educational Discoveries and Humanities

Hosted online from Moscow, Russia

Website: [econfseries.com](http://econfseries.com)

16<sup>th</sup> May, 2025

**Факторы риска:** Выявлены статистически значимые факторы риска развития несостоятельности ЛСШ (например, высокий ИМТ, наличие сопутствующих заболеваний, технические особенности операции) и кровотечений (например, нарушение гемостаза, большой объем резецированного желудка).

**Методы лечения:** Описаны основные методы диагностики (например, рентгенография с контрастом, эндоскопия, КТ) и лечения (консервативные и хирургические) различных осложнений.

### **Вывод:**

Осложнения после лапароскопической рукавной резекции желудка представляют собой значимую проблему, требующую тщательного изучения и разработки эффективных стратегий профилактики и лечения. Ранние осложнения, такие как кровотечения и несостоятельность ЛСШ, связаны с техническими и пациент-специфическими факторами риска и требуют своевременной диагностики и интенсивной терапии. Поздние осложнения, включая ГЭРБ и стриктуры, могут существенно влиять на долгосрочные результаты лечения и требуют комплексного подхода к ведению пациентов. Дальнейшие исследования, направленные на совершенствование хирургической техники, выявление пациентов высокого риска и разработку персонализированных стратегий профилактики и лечения осложнений, являются необходимыми для повышения безопасности и эффективности SLEEVE.