



ЮМШОҚ ТЎҚИМАЛАР САРКОМАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНИШНИНГ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ҲОЛАТИ

Шералиева С.Ж.,

Полатова Д.Ш.

Тошкент давлат стоматология институти, Ташкент, Ўзбекистон

Тадқиқот мақсади:

Ўзбекистонда юмшоқ тўқималар саркомаси билан касалланишнинг клиник-эпидемиологик кўрсаткичларини ўрганиш ва эпидемиологик хавф ҳудудларни аниқлаш.

Материал ва усуллар:

Ўтказилган ушбу илмий ишимизда 2015-2023 йил давомида Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази филиалларида рўйхатга олинган бирламчи касалланган 3527 нафар беморлар ретроспектив таҳлили ўтказилди. Унга кўра беморларнинг касалланишнинг «қўпол» ва стандартлашган кўрсаткичлари ўрганиб чиқилди. Ушбу беморлардан аёллар 1870 (53%) нафарини, 1657 нафарини (47%) эса эркак кишилар ташкил этди. Беморларнинг ўртача ёш кўрсаткичи 51,4 ни ташкил этди.

Натижа:

Текширувларга кўра, Республикада юмшоқ тўқима саркомалари билан касалланишнинг «қўпол» кўрсаткичлари 2015 йилда 1,3; 2016 ва 2017 йилларда 1,2; 2018 йилда 1,1; 2019 ва 2020 йилларда 1,2; 2021 йилда 1,6 ва 2022 йилда эса 1,7 ни ташкил этди. Юмшоқ тўқима саркомалари билан касалланишнинг стандартлашган кўрсаткичлари 2015 йилда 1,6; 2016 йилда 1,16; 2017 йилда 1,36; 2018 йилда 1,1; 2019, 2022 ва 2023 йилларда эса 1,3 ни кўрсатди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, юмшоқ тўқима саркомалари билан касалланиш кўрсаткичи охириги 3 йилда кескин ошганлигини кўришимиз мумкин. Бу эса аҳолини онкологик касалликлар профилактикаси учун ўтказиладиган скрининг текширувларининг натижаси деб қараш мумкин.